

Rhinopneumonie


Voorzorgsmaatregelen tegen abortus

Rhinopneumonie is een virusziekte waarmee alle paarden in Nederland regelmatig in contact komen en die drie verschijningsvormen kent, verkoudheid, abortus (besmettelijk verwerpen) en verlamningsverschijnselen. Lang niet alle paarden worden echt ziek. De kunst is om weerstand en besmettingsdruk met elkaar in evenwicht te houden.

De abortusvorm veroorzaakt twee weken tot enkele maanden na besmetting abortus of zeer zwak geboren veulens. De besmetting met bijbehorende koortspiek wordt echter lang niet altijd waargenomen. De verspreiding van het rhinopneumonie-virus vindt voornamelijk plaats door direct contact tussen paarden of door samen stallen in één ruimte. Het directe neus-

neus contact met besmette paarden is de belangrijkste route van verspreiding, hoesten of proesten bevordert de overdracht. De neusuitvloeiing van besmette paarden kan veel virusdeeltjes bevatten, maar ook paarden zonder zichtbare neusuitvloeiing kunnen besmettelijk zijn. Het passeren van paarden op straat of in het bos is geen mogelijke bron van

besmetting als direct contact wordt voorkomen.

In principe kan het virus ook door de mens via kleren en handen worden overgedragen, waardoor deze van het ene naar het andere paard gaat. Door goed douchen en schone kleren en schoenen kan de kans op deze vorm van overbrengen sterk worden verminderd. 

Fokkers kunnen de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

- Contact (vooral neus-aan-neus contact) met vreemde paarden vermijden.
- Fokmerries apart huisvesten en niet in contact met wedstrijdpaarden of jonge paarden laten komen.
- Goed ventileren zorgt voor voldoende frisse lucht.
- Alle paarden in de stal tweemaal per jaar vaccineren draagt bij aan verminderde uitscheiding van virus.
- Fokmerries driemaal gedurende de dracht laten vaccineren draagt bij aan de bescherming. Dit moet gebeuren in de vijfde, zevende en negende maand van de dracht.
- Stress (bijvoorbeeld als gevolg van transport of wisseling van stal of groep) vermijden omdat een 'slapende infectie' door stress geactiveerd kan worden.
- Goede verzorging (voldoende water en voeding) verhoogd de weerstand.
- Goede hygiëne en desinfectie reduceert de kans op verspreiding van het virus.
- Vaste verzorger per groep dieren en niet van groep naar groep lopen.
- Verdachte paarden dagelijks temperatuur.
- Geen besmette bedrijven bezoeken.

Tips voor een goede desinfectie:

- Alle bodembedekking (stro, zaagsel of vlas) verwijderen en zo snel mogelijk van het bedrijf afvoeren.
- Bodem en muren goed huishoudelijk reinigen door schrobben met water en zeep (geen hogedrukspuit gebruiken voor het schoonmaken, omdat het virus zich dan via kleine waterdruppeltjes in de lucht kan verspreiden).
- Bodem en muren goed op laten drogen (virussen kunnen slecht tegen uitdroging).
- Vervolgens desinfecteren met Halamid in de voor virussen voorgeschreven concentratie en dit gedurende 20 minuten in laten werken.
- Daarna goed spoelen met water.

Wacht niet tot geruchten over een uitbraak in de krant verschijnen, maar tref nu uw voorzorgsmaatregelen. Hoe eerder en zorgvuldiger u bent, des te groter de kans dat u problemen voorkomt.